

NOTE DE PRESENTATION

Ce bulletin vise à permettre de suivre régulièrement l'évolution générale des conditions agrométéorologiques prévalant dans les différentes régions du pays décade après décade, au cours de l'année. La réalisation de cet objectif se heurte à deux difficultés non négligeables que sont :

1°) la mauvaise répartition du réseau agrométéorologique national dense au Sud et trop lâche dans le Nord.

2°) le manque des moyens de transmission régulière sur un grand nombre de stations pourtant intéressantes du point de vue agrométéorologique.

Ce dernier écueil oblige à ne retenir actuellement que le nombre limité des stations disposant de moyens de transmission convenables effectuant un travail régulier tenues par des professionnels. C'est pour toutes ces raisons que figurent dans un bulletin, principalement des données relatives aux stations synoptiques de la Direction de la Météorologie Nationale.

Globalement les éléments agrométéorologiques déterminés grâce aux mesures et observations faites sur une quelconque de ces stations donnent des renseignements très utiles, sur les aspects climatiques (atmosphériques et édaphiques) des conditions de développement et de croissance des cultures. D'ailleurs, le domaine de représentativité de ces renseignements dépasse généralement très largement les limites de la circonscription administrative au lieu d'implantation de la station.

Plus localement, ce bulletin pourrait également servir aux ingénieurs et techniciens qui, en fonction du stade de développement de leurs cultures, et la capacité de rétention des sols de leur exploitation, pourraient tirer profit des différents bilans hydriques climatiques et efficaces pour mieux conduire leur irrigation.

Ce bulletin comprend un **TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE** résumant les données agrométéorologiques de températures, de déficit de saturation, de rayonnement global, de pluviométrie, d'évapotranspiration potentielle etc.. relevées au cours de la décade.

Cette publication contient aussi un **TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS** présentant les écarts pluviométriques à la moyenne et à leur variation, les bilans hydriques climatiques, les bilans hydriques efficaces et les écarts d'Evapotranspiration à la moyenne.

Par ailleurs, ce tableau renferme des bilans Hydriques Efficaces tenant compte des trois niveaux de Réserves Hydriques Utilisables des sols ci-dessous, qui ont été retenues. Compte tenu de la carte des aptitudes culturales et forestières des sols de la Côte d'Ivoires établie par APERRAUD en 1971.

RU= 30 mm pour les sols à mauvaise capacité de rétention
RU= 60 mm pour les sols à moyenne capacité de rétention
RU= 100 mm pour les sols à bonne capacité de rétention

A partir de ces trois niveaux de RU, le spécialiste local connaissant précisément les capacités de rétention du sol de son exploitation, peut choisir dans ce tableau, les valeurs de Bilans Hydriques Efficaces les plus appropriés pour la conduite de ses activités agricoles.

Ce dernier tableau des écarts et des bilans est suivi d'un **COMMENTAIRE**, prenant en compte les spécificités des différentes zones climatiques du pays.

LEGENDE DES ABREVIATIONS UTILISEES

Températures (degrés et dixième)

Tx moy	=	Moyenne des températures maxi journalières
Tn moy	=	Moyenne des températures mini journalières
T moy	=	Moyenne des températures extrêmes décadaires (Tx+Tn)/2
Txg moy	=	Moyenne des températures maxi journalières à 5 cm au dessous du sol
Tng moy	=	Moyenne des températures mini journalières à 5 cm au dessous du sol
T10	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 10 cm dans le sol)
T20	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 20 cm dans le sol)

Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

U %	=	Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h
DST	=	Déficit de saturation de 7h à 17h (ew-e) en millibars (mb)
F	=	Vitesse de vent en mètres par seconde (m/s)

Insolation et Rayonnement global

H	=	Durée d'insolation décadaire (en heures)
H	=	Durée d'insolation décadaire moyenne (en heures)
Rg	=	Rayonnement Global décadaire en (en cal/ cm ² /jour)

Pluviométrie

Haut	=	Hauteur pluviométrique décadaire (en mm)
Nj	=	Nombre de jour de pluie de la décade
Nj5	=	Nombre de jour de pluie \geq à 5 mm

Evapotranspiration et Evaporation

ETP	=	Evapotranspiration potentielle (en mm)
Evap Bac A	=	Evaporation Bac classe A (en mm)

Ecarts pluviométriques et d'évapotranspiration potentielle

EM	=	Ecart à la moyenne pluviométrique (en mm)
VEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
CEM	=	Cumul des écarts à la moyenne pluviométrique (en mm)
VCEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
BE	=	Ecarts d'évapotranspiration potentielle par rapport à l' ETP moyenne (en mm)
VBE	=	Variation des écarts d'évapotranspiration potentielle (%)

Bilan Hydriques Climatiques

BH	=	Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VBH	=	Variation des Bilan hydriques Climatiques (en mm)
CBH	=	Cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VCBH	=	Variation du cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)

Bilans Hydriques Efficaces

RU	=	Réserves Utiles (en mm)
BHE	=	Bilans Hydriques Efficaces (en mm)

TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE

DECADE: 3

MOIS: MAI

ANNEE : 2007

	Températures (degrés et dixième)							Humidité Déficit de Saturation et Vitesse du vent			Insolation et Rayonnement global			Pluviométrie et Nbre de jours de pluie			Evapotranspiration et Evaporation (mm)	
	Sous abri (°C)			à 5 cm au dessus du sol (°C)		Dans le sol (°C)		U (%)	DST (mb)	F (m/s)	H (heure)	H Moy (heure)	Rg (cal/cm2/jour)	Haut (mm)	NJ	NJ5	ETP	Evap Bac A
	T _x moy	T _n moy	T moy	T _{xg} moy	T _{ng} moy	T ₁₀	T ₂₀											
BONDOUKOU	30.1	23.2	26.7	37.4	22.4	36.2	29.2	72	6.6		68	68	452.6	4	3	0	43.2	
DALOA	33.1	22.9	28.0	42.3	22.9	30.1	26.9	80	8.9		73	73	431.2	13	3	1	42.7	
DIMBOKRO	34.2	23.5	28.9	44.0	22.9	31.8	31.0	80	9.1		78	70	476.6	24	5	3	48.2	
YAMOOUSSOUKRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	-	12	1	1	-	
GAGNOA	33.8	22.4	28.1	39.8	21.8	30.7	30.2	54	9.0		59	59	383.6	51	4	3	37.2	
ADIAKE	32.0	23.9	28.0	40.3	21.5	31.1	30.4	86	8.3		56	56	373.3	51	6	3	38.3	
ABIDJAN	31.8	23.5	27.7	41.3	21.6	32.8	31.6	84	5.3		60	61	384.6	71	9	3	37.6	
SASSANDRA	31.1	23.6	27.4	41.0	21.2	32.1	31.7	86	6.5		68	56	409.9	28	5	2	39.5	
SAN-PEDRO	31.8	23.0	27.4	41.5	21.4	32.3	31.1	84	5.0		46	46	339.7	67	4	1	33.9	
TABOU	31.0	21.8	26.4	41.3	21.6	31.0	30.6	84	4.2		57	45	374.9	63	5	3	35.0	

TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS

DECADE 3 MOIS: MAI ANNEE: 2 007

	ECARTS PLUVIOMETRIQUES ET D'EVAPOTRANSPIRATIONS POTENTIELLES						BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES				BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E en mm)		
	E.M (mm)	VEM (%)	C.E.M. (mm)	VCEM (%)	BE (mm)	VBE (%)	BH (mm)	VBH (%)	CBH (mm)	VCBH (%)	RU = 30 mm	RU = 60 mm	RU = 100 mm
BONDOUKOU	-55	-93	-244	-52	+2	+5	-39	-100	-481	-100	-30	-35	-35
DALOA	-35	-73	-200	-42	+1	+2	-30	-100	-373	-100	-16	+2	+2
DIMBOKRO	-32	-57	-161	-32	+4	+9	-24	-100	-377	-100	+11	+30	+30
YAMO USSOUKRO	-52	-81	-91	-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GAGNOA	-17	-25	-39	-7	+2	+6	+14	+42	-77	-100	+30	+60	+100
ADIAKE	-108	-68	-78	-12	+1	+3	+13	+11	+35	+97	+30	+42	+77
ABIDJAN	-68	-49	-211	-31	-1	-3	+33	+33	-152	-100	+30	+58	+98
SASSANDRA	-112	-80	-235	-46	+3	+8	-12	-12	-336	-100	-8	-8	-8
SAN-PEDRO	-95	-59	-231	-43	0	0	+33	+26	-257	-100	+30	+37	+77
TABOU	-174	-73	-281	-35	+2	+6	+28	+14	-104	-60	+30	+60	+100

COMMENTAIRE DE LA SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

(3^{ème} décade du mois de Mai 2007)

I°) SITAUTION PLUVIOMETRIQUE

Cette décade marque le début normal de la grande saison des pluies, mais, les quantités de pluie enregistrées au cours de la présente décade sont encore très faibles dans toutes les régions des différentes zones climatiques du pays. Ainsi, l'on a subi des déficits pluviométriques très importants variant de 50 à 80 % par rapport à la moyenne dans les régions du Littoral, et de 25 à 93 % dans les régions du Sud-intérieur et du Centre.

Il faut noter que les hauteurs de pluie de la présente décade sont nettement inférieures à celles de l'année dernière. Quant aux bilans pluviométriques cumulés, la situation actuelle reste très déficitaire par rapport à la moyenne.

II°) BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES (B.H.C.)

La demande potentielle en eau n'a pu être satisfaite dans aucune région du Centre au cours de la présente décade. Il en est pratiquement de même dans la presque totalité des régions du Sud-intérieur. Seule, la région de Gagnoa a enregistré des excédents hydriques climatiques de 42 % par rapport à la moyenne dans cette zone climatique du pays. Dans les régions du Littoral, la demande potentielle en eau a été satisfaite dans toutes les régions à l'exception de celle de Sassandra qui accuse des déficits hydriques de 12 % par rapport à la moyenne.

Les bilans hydriques climatiques cumulés sont partout déficitaires dans les régions des différentes zones climatiques sauf dans la seule région de Gagnoa dans le Sud-intérieur.

III°) BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E.)

Cette décade se situe en temps normal dans la période végétative des cultures tant vivrières et pérennes. Les sols devraient avoir des réserves en eau suffisantes pour les activités agricoles. Mais, force est de constater qu'ils sont très peu humides et même totalement dépourvus d'humidité dans certaines régions du Centre et du Littoral (Bondoukou et Sassandra). Notons que dans les régions forestières de la moitié sud du pays, les sols sont relativement bien humides. Ainsi, les conditions hydriques des sols sont assez satisfaisantes dans cette zone climatique du pays et les cultures peuvent poursuivre leur cycle végétatif sans trop de problèmes d'ordre hydrique.

L'analyse des bilans hydriques efficaces est basée sur les considérations suivantes :




L'analyse des Bilans Hydriques Efficaces est d'ordre général, pour chacune des zones climatiques du pays. C'est donc à dessein que nous nous écarterons ici du souci du spécialiste local qui doit s'appuyer sur une connaissance précise de Réserve Utilisable (RU) du sol de son exploitation.

Cette analyse est de ce fait, basée sur des considérations assez générales. Notamment, la Réserve Utilisable (RU) au niveau de chaque station a été prise comme correspondant à celle des sols prédominants dans la zone climatique de la station. Par conséquent on retient, pour l'analyse succincte ci-dessous :

- a) *En zone climatique Nord : RU = 30 mm, pour les régions de Korhogo et Odienné ;*
- b) *En zone climatique centre et sud intérieur : RU = 60 mm (pour les régions de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Man, Dimbokro, Yamoussoukro et Gagnoa) ;*
- c) *En zone climatique Sud-littoral : RU = 100 mm (pour les régions de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pedro et Tabou).*

Graphiques des Bilans Hydrauliques

Annexe 1



Annexe 2

