


BULLETIN AGROMETEOROLOGIQUE DECADEIRE



DECADE : 2 MOIS : AVRIL ANNEE : 2010

SOMMAIRE

Note de présentation
Tableau Agrométéorologique
Tableau des bilans
Commentaire
Graphiques de Bilans Hydriques

NOTE DE PRESENTATION

Ce bulletin vise à permettre de suivre régulièrement l'évolution générale des conditions agrométéorologiques prévalant dans les différentes régions du pays décade après décade, au cours de l'année. La réalisation de cet objectif se heurte à deux difficultés non négligeables que sont :

1°) la mauvaise répartition du réseau agrométéorologique national dense au Sud et trop lâche dans le Nord.

2°) le manque des moyens de transmission régulière sur un grand nombre de stations pourtant intéressantes du point de vue agrométéorologique.

Ce dernier écueil oblige à ne retenir actuellement que le nombre limité des stations disposant de moyens de transmission convenables effectuant un travail régulier tenues par des professionnels. C'est pour toutes ces raisons que figurent dans un bulletin, principalement des données relatives aux stations synoptiques de la Direction de la Météorologie Nationale.

Globalement les éléments agrométéorologiques déterminés grâce aux mesures et observations faites sur une quelconque de ces stations donnent des renseignements très utiles, sur les aspects climatiques (atmosphériques et édaphiques) des conditions de développement et de croissance des cultures. D'ailleurs, le domaine de représentativité de ces renseignements dépasse généralement très largement les limites de la circonscription administrative au lieu d'implantation de la station.

Plus localement, ce bulletin pourrait également servir aux ingénieurs et techniciens qui, en fonction du stade de développement de leurs cultures, et la capacité de rétention des sols de leur exploitation, pourraient tirer profit des différents bilans hydriques climatiques et efficaces pour mieux conduire leur irrigation.

Ce bulletin comprend un **TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE** résumant les données agrométéorologiques de températures, de déficit de saturation, de rayonnement global, de pluviométrie, d'évapotranspiration potentielle etc.. relevées au cours de la décade.

Cette publication contient aussi un **TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS** présentant les écarts pluviométriques à la moyenne et à leur variation, les bilans hydriques climatiques, les bilans hydriques efficaces et les écarts d'Evapotranspiration à la moyenne.

Par ailleurs, ce tableau renferme des bilans Hydriques Efficaces tenant compte des trois niveaux de Réserves Hydriques Utilisables des sols ci-dessous, qui ont été retenues. Compte tenu de la carte des aptitudes culturales et forestières des sols de la Côte d'Ivoires établie par APERRAUD en 1971.

RU= 30 mm pour les sols à mauvaise capacité de rétention

RU= 60 mm pour les sols à moyenne capacité de rétention

RU= 100 mm pour les sols à bonne capacité de rétention

A partir de ces trois niveaux de RU, le spécialiste local connaissant précisément les capacités de rétention du sol de son exploitation, peut choisir dans ce tableau, les valeurs de Bilans Hydriques Efficaces les plus appropriés pour la conduite de ses activités agricoles.

Ce dernier tableau des écarts et des bilans est suivi d'un **COMMENTAIRE**, prenant en compte les spécificités des différentes zones climatiques du pays.

LEGENDE DES ABREVIATIONS UTILISEES

Températures (degrés et dixième)

Tx moy	=	Moyenne des températures maxi journalières
Tn moy	=	Moyenne des températures mini journalières
T moy	=	Moyenne des températures extrêmes décadaires (Tx+Tn)/2
Txg moy=	=	Moyenne des températures maxi journalières à 5 cm au dessous du sol
Tng moy	=	Moyenne des températures mini journalières à 5 cm au dessous du sol
T10	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 10 cm dans le sol)
T20	=	Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 20 cm dans le sol)

Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

U %	=	Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h
DST	=	Déficit de saturation de 7h à 17h (ew-e) en millibars (mb)
F	=	Vitesse de vent en mètres par seconde (m/s)

Insolation et Rayonnement global

H	=	Durée d'insolation décadaire (en heures)
H	=	Durée d'insolation décadaire moyenne (en heures)
Rg	=	Rayonnement Global décadaire en (en cal/ cm ² /jour)

Pluviométrie

Haut	=	Hauteur pluviométrique décadaire (en mm)
Nj	=	Nombre de jour de pluie de la décade
Nj5	=	Nombre de jour de pluie ≥ à 5 mm

Evapotranspiration et Evaporation

ETP	=	Evapotranspiration potentielle (en mm)
Evap Bac A	=	Evaporation Bac classe A (en mm)

Ecarts pluviométriques et d'évapotranspiration potentielle

EM	=	Ecart à la moyenne pluviométrique) en mm)
VEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
CEM	=	Cumul des écarts à la moyenne pluviométrique (en mm)
VCEM	=	Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
BE	=	Ecarts d'évapotranspiration potentielle par rapport à l' ETP moyenne (en mm)
VBE	=	Variation des écarts d'évapotranspiration potentielle (%)

Bilan Hydriques Climatiques

BH	=	Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VBH	=	Variation des Bilan hydriques Climatiques (en mm)
CBH	=	Cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)
VCBH	=	Variation du cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)

Bilans Hydriques Efficaces

RU	=	Réserves Utiles (en mm)
BHE	=	Bilans Hydriques Efficaces (en mm)

A- REMARQUES :

- 1) Les cumuls de bilans pluviométriques et hydriques climatiques décennaux sont à partir de la 1^{ère} décennie du mois de Janvier de l'année en cours.
- 2) De même les bilans hydriques efficaces ont été faits à partir de la 1^{ère} décennie du mois de Janvier de l'année en cours.

B- NOTES SUR LE MODELE DE BILAN HYDRIQUE EFFICACE UTILE

- 1) Dans ce modèle l'offre hydrique au début d'une décennie donne (i) est calculée en tenant compte de l'état de la réserve hydrique du sol à la fin de la décennie (i-1) précédente.
- 1) Les dépenses en eau des cultures sont globalement estimées par la formule $ETM = Kc \cdot ETP$. L'ETP est calculée avec la formule de PENMAN et les valeurs du coefficient Kc sont indiquées région par région suivant les schéma ci-contre.
- 3) Il y a ruissellement et drainage dès que l'offre hydrique potentielle dépasse le seuil de RU fixé.

Valeurs des coefficients Kc utilisés pour le calcul de l'ETM à l'échelle régionale

NORD



CENTRE



SUD



TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADEIRE

DECADE:

2

MOIS:

AVRIL

ANNEE : 2010

	Températures (degrés et dixième)							Humidité Déficit de Saturation et Vitesse du vent			Insolation et Rayonnement global			Pluviométrie et Nbre de jours de pluie			Evapotranspiration et Evaporation (mm)	
	Sous abri (°C)			à 5 cm au dessus du sol (°C)		Dans le sol (°C)		U (%)	DST (mb)	F (m/s)	H (heure)	H Moy (heure)	Rg (cal/cm2/jour)	Haut (mm)	NJ	NJ5	ETP	Evap Bac A
	T _x moy	T _n moy	T moy	T _{xg} moy	T _{ng} moy	T ₁₀	T ₂₀											
BONDOUKOU	35.5	23.5	29.5	45.5	21.4	35.9	33.8	73	12.9	1	72	69	477.4	26	4	3	50.4	
DALOA	35.6	22.8	29.2	41.5	22.3	32.1	30.9	79	11.3	1	79	73	468.1	13	3	1	47.9	
DIMBOKRO	37.0	23.4	30.2	45.6	22.9	31.2	31.1	78	10.9		76	74	489.6	49	5	4	52.0	
YAMOOUSSOUKRO	35.0	22.1	28.6	43.9	21.9	33.2	32.1	74	9.8	2	71	67	474.4	97	5	3	48.4	
GAGNOA	34.0	23.9	29.0	44.7	21.4	31.8	31.6	80	10.9		74	70	450.5	20	2	2	43.6	
ADIAKE	34.0	25.0	29.5	46.3	20.7	32.4	32.2	81	9.2	0	71	68	439.5	41	2	1	43.6	
ABIDJAN	34.2	25.8	30.0	46.8	24.5	35.2	33.9	82	6.8	0	73	75	456.4	13	3	1	47.3	
SASSANDRA	33.6	25.1	29.4	45.6	24.7	36.5	34.0	85	7.7		76	73	457.1	22	2	2	46.6	
SAN-PEDRO	33.7	24.2	29.0	44.5	20.1	33.8	33.6	83	7.3	2	76	64	456.4	14	1	1	45.8	
TABOU	33.2	24.8	29.0	44.9	23.9	32.0	31.1	86	7.0		64	66	412.3	21	2	1	42.3	

TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS

DECADE 1

MOIS: AVRIL

ANNEE: 2010

	ECARTS PLUVIOMETRIQUES ET D'EVAPOTRANSPIRATIONS POTENTIELLES						BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES				BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E en mm)		
	E.M (mm)	VEM (%)	C.E.M. (mm)	VCEM (%)	BE (mm)	VBE (%)	BH (mm)	VBH (%)	CBH (mm)	VCBH (%)	RU = 30 mm	RU = 60 mm	RU = 100 mm
BONDOUKOU	-12	-32	-117	-43	+4	+9	-24	-100	-342	-100	-19	-4	-4
DALOA	-40	-75	-70	-23	+3	+7	-35	-100	-240	-100	0	+30	+49
DIMBOKRO	+11	+29	+21	+7	+2	+4	-3	-25	-205	-100	+30	+60	+100
YAMOOUSSOUKRO	+61	+100	+38	+14	0	0	+49	+100	-188	-84	+30	+60	+100
GAGNOA	-30	-60	+72	+22	+2	+5	-24	-100	+10	+10	+10	+40	+80
ADIAKE	-7	-15	+102	+33	0	0	-3	-75	-48	-33	+1	+31	+71
ABIDJAN	-38	-75	-37	-13	0	0	-34	-100	-212	-100	+10	+40	+40
SASSANDRA	-13	-37	+43	+19	+3	+7	-25	-100	-202	-86	+10	+40	+50
SAN-PEDRO	-18	-56	+103	+50	+2	+5	-32	-100	-162	-68	+3	+33	+73
TABOU	-27	-56	+105	+39	+1	+2	-21	-100	-77	-47	+9	+39	+79

COMMENTAIRE DE LA SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

(2^{ème} décennie du mois d'Avril 2010)

I°) SITUATION PLUVIOMETRIQUE

De faibles quantités de pluie sont tombées sur l'ensemble des régions du pays au cours de la présente décennie. Elles ont été très faibles dans les zones climatiques du Centre et du Littoral. Cependant, la grande majorité des régions a enregistré des hauteurs de pluie supérieures à 13 mm dans le Centre, 20 mm dans le Sud-intérieur et 14 mm sur le Littoral.

Ainsi, dans le Centre, aucune région n'a enregistré une hauteur de pluie supérieure à la moyenne. Elles ont toutes subi des déficits pluviométriques variant de 32 à 75% par rapport à la moyenne. Sur le Littoral, la situation est identique à celle du Centre. Les déficits pluviométriques varient de 15 à 75%. Dans le Sud-intérieur, l'on a néanmoins enregistré des excédents dans les régions de Dimbokro (29%) et de Yamoussoukro (100%). L'année dernière, les pluies n'étaient supérieures qu'à 40 mm que dans les régions de Dimbokro et de Yamoussoukro dans le Sud-intérieur et d'Adiaké sur le Littoral.

Le régime pluviométrique est encore en dessous de la moyenne dans la presque totalité des régions du pays. Notons que les hauteurs de pluie cumulées sont par contre supérieures à la moyenne dans les régions de Dimbokro, de Yamoussoukro, de Gagnoa, d'Adiaké, de Sassandra, de San Pedro et de Tabou.

I°) BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES (B.H.C.)

L'offre hydrique au cours de la présente décennie reste encore insuffisante pour satisfaire la demande potentielle en eau dans la quasi-totalité des régions du pays. A l'exception de la région de Yamoussoukro où l'on a enregistré des excédents hydriques de 100%, toutes les régions sont caractérisées par des déficits hydriques climatiques de 100% sur l'ensemble des autres régions. L'année dernière, l'on avait partout subi des déficits plus ou moins importants à part les régions de Daloa, de Yamoussoukro, de Gagnoa et d'Adiaké.

Rappelons que les bilans hydriques moyens sont eux-mêmes presque partout déficitaires au cours de cette 2^{ème} décennie d'avril.

III°) BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E.)

C'est seulement les régions de Dimbokro et de Yamoussoukro qui présentent des sols à la capacité au champ au cours de la présente décennie. Partout ailleurs, les sols sont plus ou moins humides à des taux allant de 40 à 79%. Notons que les régions du Centre ont encore des sols très peu humides et même pratiquement dépourvus d'humidité.

La période de transition continue. Les activités culturales se poursuivent avec les travaux de préparation et de semis des cultures précoces dans la presque totalité des régions des zones climatiques du Sud-intérieur et du Littoral. Les cultures pérennes des régions forestières du sud connaissent aussi les phases de poussées de nouvelles feuilles, de floraison et de développement des fruits, tandis que dans le Centre, il faudra encore attendre les décennies à venir

L'analyse des bilans hydriques efficaces est basée sur les considérations suivantes :




L'analyse des Bilans Hydriques Efficaces est d'ordre général, pour chacune des zones climatiques du pays. C'est donc à dessein que nous nous écarterons ici du souci du spécialiste local qui doit s'appuyer sur une connaissance précise de Réserve Utilisable (RU) du sol de son exploitation.

Cette analyse est de ce fait, basée sur des considérations assez générales. Notamment, la Réserve Utilisable (RU) au niveau de chaque station a été prise comme correspondant à celle des sols prédominants dans la zone climatique de la station. Par conséquent on retient, pour l'analyse succincte ci-dessous :

- a) En zone climatique Nord : RU = 30 mm, pour les régions de Korhogo et Odienné ;
- b) En zone climatique centre et sud intérieur : RU = 60 mm (pour les régions de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Man, Dimbokro, Yamoussoukro et Gagnoa) ;
- c) En zone climatique Sud-littoral : RU = 100 mm (pour les régions de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pédro et Tabou).

Graphiques des Bilans Hydriques

Annexe 1



Annexe 2

