
SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE DEVELOPPEMENT AEROPORTUAIRE, AERONAUTIQUE ET METEOROLOGIQUE UNION - DISCIPLINE - TRAVAIL

Direction de la Météorologie Nationale

BULLETIN AGROMETEOROLOGIQUE DECADAIRE



DECADE: 1 MOIS: AVRIL ANNEE: 2013

SOMMAIRE

Note de présentation Tableau Agrométéorologique Tableau des bilans Commentaire Graphiques de Bilans Hydriques

15 BP 990 ABIDJAN 15 TEL :(+225) 21-58-20-01 FAX :(+225) 21-27-73-44

NOTE DE PRESENTATION

Ce bulletin vise à permettre de suivre régulièrement l'évolution générale des conditions agrométéorologiques prévalant dans les différentes régions du pays décade après décade, au cours de l'année. La réalisation de cet objectif se heurte à deux difficultés non négligeables que sont :

- 1°) la mauvaise répartition du réseau agrométéorologique national dense au Sud et trop lâche dans le Nord.
- 2°) le manque des moyens de transmission régulière sur un grand nombre de stations pourtant intéressantes du point de vue agrométéorologique.

Ce dernier écueil oblige à ne retenir actuellement que le nombre limité des stations disposant de moyens de transmission convenables effectuant un travail régulier tenues par des professionnels. C'est pour toutes ces raisons que figurent dans un bulletin, principalement des données relatives aux stations synoptiques de la Direction de la Météorologie Nationale.

Globalement les éléments agrométéorologiques déterminés grâce aux mesures et observations faites sur une quelconque de ces stations donnent des renseignements très utiles, sur les aspects climatiques (atmosphériques et édaphiques) des conditions de développement et de croissance des cultures. D'ailleurs, le domaine de représentativité de ces renseignements dépasse généralement très largement les limites de la circonscription administrative au lieu d'implantation de la station.

Plus localement, ce bulletin pourrait également servir aux ingénieurs et techniciens qui, en fonction du stade de développement de leurs cultures, et la capacité de rétention des sols de leur exploitation, pourraient tirer profit des différents bilans hydriques climatiques et efficaces pour mieux conduire leur irrigation.

Ce bulletin comprend un **TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE** résumant les données agrométéorologiques de températures, de déficit de saturation, de rayonnement global, de pluviométrie, d'évapotranspiration potentielle etc.. relevées au cours de la décade.

Cette publication contient aussi un **TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS** présentant les écarts pluviométriques à la moyenne et à leur variation, les bilans hydriques climatiques, les bilans hydriques efficaces et les écarts d'Evapotranspiration à la moyenne.

Par ailleurs, ce tableau renferme des bilans Hydriques Efficaces tenant compte des trois niveaux de Réserves Hydriques Utilisables des sols ci-dessous, qui ont été retenues. Compte tenu de la carte des aptitudes culturales et forestières des sols de la Côte d'Ivoires établie par APERRAUD en 1971.

RU= 30 mm pour les sols à mauvaise capacité de rétention

RU= 60 mm pour les sols à moyenne capacité de rétention

RU= 100 mm pour les sols à bonne capacité de rétention

A partir de ces trois niveaux de RU, le spécialiste local connaissant précisément les capacités de rétention du sol de son exploitation, peut choisir dans ce tableau, les valeurs de Bilans Hydriques Efficaces les plus appropriés pour la conduite de ses activités agricoles.

Ce dernier tableau des écarts et des bilans est suivi d'un COMMMENTAIRE, prenant en compte les spécificités des différentes zones climatiques du pays.

LEGENDE DES ABREVIATIONS UTILISEES

Températures (degrés et dixième)

Tx moy = Moyenne des températures maxi journalières Tn moy = Moyenne des températures mini journalières

T moy = Moyenne des températures extrêmes décadaires (Tx+Tn)/2 Txq moy = Moyenne des températures maxi journalières à 5 cm au dessous du sol

Tng moy = Moyenne des températures mini journalières à 5 cm au dessous du sol T10 = Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 10 cm dans le sol) T20 = Moyenne des températures journalières (relevés de 12h à 20 cm dans le sol)

Humidité – Déficit de Saturation et Vitesse du vent

U % = Humidité relative moyenne (%) de 7 h à 17h

DST = Déficit de saturation de 7h à 17h (ew-e) en millibars (mb)

F = Vitesse de vent en mètres par seconde (m/s)

Insolation et Rayonnement global

H = Durée d'insolation décadaire (en heures)

H = Durée d'insolation décadaire moyenne (en heures) Rg = Rayonnement Global décadaire en (en cal/ cm²/jour)

Pluviométrie

Haut = Hauteur pluviométrique décadaire (en mm)
Nj = Nombre de jour de pluie de la décade
Nj5 = Nombre de jour de pluie ≥ à 5 mm

Evapotranspiration et Evaporation

ETP = Evapotranspiration potentielle (en mm)
Evap Bac A = Evaporation Bac classe A (en mm)

Ecarts pluviométriques et d'évapotranspiration potentielle

EM = Ecart à la moyenne pluviométrique) en mm)

VEM = Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)
CEM = Cumul des écarts à la moyenne pluviométrique (en mm)
VCEM = Variation des écarts à la moyenne pluviométrique (en %)

BE = Ecarts d'évapotranspiration potentielle par rapport à l' ETP moyenne (en mm)

VBE = Variation des écarts d'évapotranspiration potentielle (%)

Bilan Hydriques Climatiques

BH = Bilan hydriques Climatiques (en mm)

VBH = Variation des Bilan hydriques Climatiques (en mm)
CBH = Cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)

VCBH = Variation du cumul Bilan hydriques Climatiques (en mm)

Bilans Hydrigues Efficaces

RU = Réserves Utiles (en mm)

BHE = Bilans Hydriques Efficaces (en mm)

A- REMARQUES:


- 1) Les cumuls de bilans pluviométriques et hydriques climatiques décadaires sont à partir de la 1 ère décade du mois de Janvier de l'année en cours.
- De même les bilans hydriques efficaces ont été faits à partir de la 1 ère décade du mois de Janvier de l'année en cours.

B- NOTES SUR LE MODELE DE BILAN HYDRIQUE EFFICACE UTILE


- Dans ce modèle l'offre hydrique au début d'une décade donne (i) est calculée en tenant compte de l'état de la réserve hydrique du sol à la fin de la décade (i-1) précédente.
- 1) Les dépenses en eau des cultures sont globalement estimées par la formule ETM= Kc.ETP. l'ETP est calculée avec la formule de PENMAN et les valeurs du coefficient Kc sont indiquées région par région suivant les schéma ci-contre.
- 3) Il y a ruissellement et drainage dès que l'offre hydrique potentielle dépasse le seuil de RU fixé.

Valeurs des coefficients Kc utilisés pour le calcul de l'ETM à l'échelle régionale

NORD



CENTRE



SUD




TABLEAU METEOROLOGIQUE DECADAIRE

Direction de la Météorologie Nationale

DECADE:

1

MOIS:

AVRIL

ANNEE : 2013

	Températures (degrés et dixième)								Humidité Déficit de Saturation et			Insolation et			Pluviométrie et			Evapotranspiration et Evaporation	
	Sous abri (°C)			à 5 cm au dessus du sol (°C)		Dans le sol (°C)		Vitesse du vent			Rayonnement global			Nbre de jours de pluie		(mm)			
	T _x moy	T _n moy	T moy	T _{xg} moy	T _{ng} moy	T ₁₀	T ₂₀	U (%)	DST (mb)	F (m/s)	H (heure)	H Moy	Rg (cal/cm2/jour)	Haut	NJ	NJ5	ETP	Evap Bac A	
BONDOUKOU	33.3	22.5	27.9	42.3	21.9	34.4	31.9	76	10.1	1	82	65	507.6	22	3	2	49.5		
DALOA	33.8	22.1	28.0	40.3	21.7	30.5	30.4	81	8.9	1	80	69	471.6	41	4	3	45.9		
DIMBOKRO	34.1	23.3	28.7	47.9	22.1	30.9	30.2	82	7.1	1	68	70	465.4	103	4	4	47.1		
YAMOUSSOUKRO	33.9	23.6	28.8	47.6	19.9	30.9	30.4	77	10.7	1	72	67	477.2	47	2	2	48.9		
GAGNOA	33.4	22.6	28.0	46.9	21.7	31.5	30.5	79	9.4	0	72	68	443.4	40	4	1	41.7		
ADIAKE	33.3	23.8	28.5	49.7	23.8	42.2	31.9	81	7.6	0	71	67	441.0	5	2	0	42.3		
ABIDJAN	32.7	23.5	28.1	50.2	25.2	36.5	35.0	81	4.9	0	84	75	491.6	0	0	0	45.5		
SASSANDRA	31.6	23.6	27.6	45.8	23.4	32.8	31.8	85	5.4	1	78	74	463.8	47	3	2	43.9		
SAN-PEDRO	32.6	23.7	28.2	48.3	23.4	33.8	32.7	84	7.0	0	83	63	480.0	6	3	0	44.7		
TABOU	32.7	23.0	27.9	48.6	22.4	30.7	31.1	87	7.1	0	73	70	444.2	21	3	1	41.6		

SODEXAM Direction de la Météorologie Nationale

TABLEAU DES ECARTS ET DES BILANS

DECADE 1 MOIS: AVRIL ANNEE: 2013

	ECARTS	PLUVIOME		ET D'ÉVAF TIELLES	POTRANSP	IRATIONS	Н	BIL/ 'DRIQUES (ANS CLIMATIQU	IES	BILANS HYDRIQUES EFFICACES (B.H.E en mm)			
	E.M	VEM	C.E.M.	VCEM	BE	VBE	BH	VBH	СВН	VCBH	RU = 30 mm	RU = 60 mm	RU = 100 mm	
BONDOUKOU	(mm) -18	(%) -45	(mm) -67	-29	(mm) +3	(%) +7	(mm) -27	-100	(mm) -282	-100	+27	+57	+75	
DALOA	+6	+17	+148	+58	+1	+2	-4	-44	-35	-19	+30	+60	+100	
DIMBOKRO	+66	+100	-31	-84	-1	-2	+56	+100	-246	-100	+30	+60	+100	
YAMOUSSOUKRO	+7	+18	+14	+6	+1	+2	-1	-14	-203	-96	+30	+60	+100	
GAGNOA	-9	-18	-2	-1	0	0	-1	-13	-258	-100	+30	+60	+100	
ADIAKE	-35	-88	-91	-35	-1	-2	-37	-100	-268	-100	+14	+28	+28	
ABIDJAN	-47	-100	-186	-76	-1	-2	-45	-100	-371	-100	-23	-23	-23	
SASSANDRA	+18	+62	-95	-50	-2	-4	-4	-25	-338	-100	+30	+37	+37	
SAN-PEDRO	-17	-74	-89	-51	0	0	-38	-100	-341	-100	-16	-16	-16	
TABOU	-5	-19	-115	-52	-1	-2	-20	-100	-319	-100	0	0	0	

COMMENTAIRE DE LA SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

(1ère décade du mois d'avril 2013)

I°) SITUATION PLUVIOMETRIQUE

Toutes les régions du pays ont été arrosées par des hauteurs de pluie plus ou moins importantes. Elles ont été relativement plus abondantes que celles de la décade précédente dans la grande majorité des régions. Des excédents pluviométriques sont relevés dans les régions de Daloa, de Dimbokro, de Yamoussoukro et de Sassandra. Partout ailleurs, l'on a subi des déficits pluviométriques plus ou moins importants allant de 18 à 100% par rapport à la moyenne. L'année dernière, les hauteurs de pluie de plus de 60 mm avaient été enregistrées dans les régions de Bondoukou, de Gagnoa, d'Adiaké, de Sassandra et de San-Pedro.

Au terme de cette première décade d'avril, les hauteurs de pluie cumulées ne sont supérieures à la moyenne que dans les régions de Daloa, mais ont néanmoins dépassé en hauteurs cumulées, 200 mm dans les régions de Dimbokro, de Yamoussoukro et de Gagnoa.

I°) <u>BILANS HYDRIQUES CLIMATIQUES</u> (B.H.C.)

L'offre hydrique reste toujours très faible. La demande potentielle en eau n'a donc pas été satisfaite dans la presque totalité des régions du pays. Les déficits hydriques climatiques sont assez prononcés dans les régions forestières du Sud-Intérieur et du Littoral. Seule la région de Dimbokro a pu enregistrer des excédents hydriques climatiques de 100 % par rapport à la moyenne au terme de la présente décade.

L'année dernière, l'on avait enregistré des excédents hydriques climatiques dans les régions de Gagnoa, d'Adiaké et de Sassandra. De façon générale, la quasi-totalité des régions subissent encore d'énormes déficits hydriques climatiques comme l'illustre si bien les bilans hydriques climatiques de la présente décade.

III°) <u>BILANS HYDRIQUES EFFICACES</u> (B.H.E.)

Les réserves en eau des sols s'améliorent progressivement. Les pluies de la présente décade ont quelque peu alimenté les réserves en eau des sols. Dans les régions de la moitié nord du pays, les sols sont assez humides et même à la capacité au champ dans les régions forestières du Sud-Intérieur. Sur le Littoral, les sols sont très peu humides et les réserves en eau des sols sont nulles dans les régions d'Abidjan, de San-Pedro et de Tabou.

Ainsi, l'état hydrique des sols est très satisfaisant dans les régions de la moitié nord du pays, tandis que le Sud subit une série de déficit hydrique qui pourrait causer des dommages sur les cultures pérennes (chute de fleurs et de chérelles)

L'analyse des bilans hydriques efficaces est basée sur les considérations suivantes :


L'analyse des Bilans Hydriques Efficaces est d'ordre général, pour chacune des zones climatiques du pays. C'est donc à dessein que nous nous écarterons ici du souci du spécialiste local qui doit s'appuyer sur une connaissance précise de Réserve Utilisable (RU) du sol de son exploitation.


Cette analyse est de ce fait, basée sur des considérations assez générales. Notamment, la Réserve Utilisable (RU) au niveau de chaque station a été prise comme correspondant à celle des sols prédominants dans la zone climatique de la station. Par conséquent on retient, pour l'analyse succincte ci-dessous :


- a) En zone climatique Nord : RU = 30 mm, pour les régions de Korhogo et Odienné ;
- b) En zone climatique centre et sud intérieur : RU = 60 mm (pour les régions de Bondoukou, Bouaké, Daloa, Man, Dimbokro, Yamoussoukro et Gagnoa) ;
- c) En zone climatique Sud-littoral : RU = 100 mm (pour les régions de Adiaké, Abidjan, Sassandra, San Pédro et Tabou).

Graphiques des Bilans Hydriques

Annexe 1







Annexe 2

